



عدوى بكتيريا المطثية العسيرة (C. Diff)

ما هو مسبب العدوى؟

هي بكتيريا لا هوائية تتكاثر بالأبواغ وتتسبب التهاب في الأمعاء الغليظة (القولون). تتراوح الأعراض من الإصابة بإسهال إلى حدوث ضرر بالقولون يهدد الحياة.

ما هي الاعراض المصاحبة لهذه العدوى؟

- الاسهال المائي 3 مرات او اكثر في اليوم.
- حرارة .
- ألم بالمعدة .
- فقدان الشهية .
- غثيان.
- الام في البطن.

من هم المعرضون لمثل هذه العدوى؟

- كبار السن الذين تتجاوز اعمارهم ال 65.
- المرضى ذوي المناعة المنخفضة.
- المرضى الذين يتلقون علاج بالمضادات الحيوية لمدة طويلة .
- المرضى المقيمين داخل المستشفى لفترة طويلة.

ما هي طرق انتشار هذه البكتيريا؟

ينتقل مثل هذا النوع من البكتيريا عن طريق لمس المريض او الاسطح الملوثة بالبكتيريا او تناول المأكولات الملوثة بالبكتيريا .

ما هو العلاج ومتى يتم ازالة المريض من العزل؟

- يتم العلاج من خلال تناول المريض لمضاد حيوي لفترة محددة تتراوح بين ايام الى اسابيع
- تم إيقاف العزل عادة عن المريض بعد توقف الاسهال لمدة يومين ع الأقل ما لم يكن هناك

ما هي الاجراءات اللازمة اتباعها عند الاصابة بالعدوى داخل المستشفى؟

- يوضع المريض تحت اجراءات عزل باللمس.
- ارتداء ادوات العزل (كقفوف ومربول)
- عند دخول الغرفة والعناية بالمريض.
- التزام بغسل الايدي بالماء والصابون.
- عدم الجلوس على سرير المريض
- يفضل عدم زيارة المريض حتى ينتهي العزل
- عدم احضار كبار السن او مرضى المناعة المنخفضة للزيارة
- عدم التنقل داخل مرافق المستشفى وبين غرف المرضى.